

**Ueber den Einfluß von Natriumbromid auf
den intermediären Kohlenhydratstoffwechsel**

Dr. med. Josef Marke

Aus dem Pharmakologischen Institut
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Westfalen.
Direktor: Professor Dr. med. et phil. H. Freund.

Über den Einfluß von Natriumbromid auf den inter- mediären Kohlenhydratstoffwechsel

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde der Hohen
Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster (Westf.)

vorgelegt von
Josef Marke
aus Münster / Westf.

1934

Gedruckt in der Buchdruckerei Franz Grube, Werne a. d. Lippe.

Dekan: Professor Dr. Esch.

Referent: Privatdozent Dr. med. et phil. W. Haarmann.

Korreferent; Professor Dr. med. et phil. H. Freund.



Ueber den Einfluß von Natriumbromid auf den intermediären Kohlenhydratstoffwechsel.

Die Einwirkung von Bromsalzen auf Stoffwechselvorgänge in überlebendem Gewebe sind bisher kaum Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Schulte-Hostede¹⁾ untersuchte den Einfluß von Bromid auf die Dehydrierungsvorgänge im Gewebe und stellte je nach der Konzentration Steigerungen und Hemmungen der Dehydrierungen fest. In starken Verdünnungen wird das Dehydrierungsvermögen des Gewebes gefördert. Mit zunehmender Konzentration läßt die Förderung nach, ohne daß jedoch eine Hemmung kommt. Der Glykogenabbau wird durch mittlere Konzentrationen gesteigert. Der Glukoseabbau wird nur wenig beeinflußt. Falls Einwirkungen feststellbar sind, so verlaufen sie ganz im Sinne der Arndt-Schulz'schen Regel. Die Dehydrierung der Hexosediphosphorsäure verhält sich anders. Sie wird durch niedere Konzentrationen von Bromid verzögert und durch hohe Konzentrationen häufig angeregt. Die Versuche von Schulte-Hostede¹⁾ erbrachten den Nachweis, daß Bromid auf die intermediären Stoffwechselvorgänge einwirkt. Es war Aufgabe der vorliegenden Arbeit, den Einfluß der Bromide auf eine Reihe von intermediären Kohlenhydratabbauvorgänge zu untersuchen. Die Versuchsanordnung war die im hiesigen Institut übliche. Bestimmt wurde die Milchsäurebildung im Gewebe und zwar sowohl aus den im Gewebe präformierten wie aus zugesetzten Kohlenhydraten. Die Konzentration des zugesetzten Natriumbromid ist in den Tabellen angegeben.

Versuchsserie I.

Der Milchsäuregehalt der Organe beim lebenden Tiere ist sehr gering. Er beträgt nur wenige mg %. Milchsäurebildung und Weiterverwertung der entstandenen Milchsäure halten sich

¹⁾ G. Schulte-Hostede: Inaugural-Dissertation, Münster, 1932.

das Gleichgewicht. Nach dem Tode des Tieres häuft sich die Milchsäure im Gewebe infolge unzureichender Sauerstoffversorgung an. Das Milchsäuremaximum tritt dann auf, wenn infolge der durch die Milchsäure bedingten Säuerung des Gewebes die milchsäurebildenden Fermente unwirksam werden. Verhindert man durch Zusatz von Stoffen, die die gebildete Milchsäure neutralisieren, die Anhäufung von freien Säuren, so geht die Milchsäurebildung weiter und kommt erst zum Stillstand, wenn sämtliche im Gebrauch vorhandenen Kohlenhydrate — es handelt sich hier im wesentlichen um das Glykogen — in Milchsäure umgewandelt sind. Ein bestimmtes Milchsäuremaximum stellt sich dann also nicht ein. Setzt man dem Gewebe Kohlenhydrate hinzu, so werden diese je nach ihrer Verwertbarkeit durch das betreffende Organ zu Milchsäure abgebaut. Der Skelettmuskel vom Kaninchen zieht nach Versuchen von H a a r m a n n ²⁾ in erster Linie das Glykogen und die Hexosediphosphorsäure (Harden-Young'sche Säure) zur Milchsäurebildung heran, nicht oder nur in sehr geringem Umfange die Glukose und Fruktose. Hundemuskel verhält sich ähnlich, jedoch mit der Einschränkung, daß das Glykogen nur unregelmäßig zur Milchsäure hydrolysiert wird. Für Untersuchungen des Glukoseabbaues kommen vor allem Herzmuskel- und Hirngewebe in Betracht, die die Glukose sehr leicht in Milchsäure überführen, nicht aber Glykogen.

Der Einfluß von Natriumbromid auf das Vermögen des Skelettmuskels, aus denen im Gewebe vorhandenen Kohlenhydraten Milchsäure zu bilden und aus hinzugesetzten Kohlenhydraten Hexosediphosphat, ist aus den Tabellen 1a bis 1c zu ersehen. In Tabelle 1a sind die gefundenen Milchsäurewerte in mg% aufgezeichnet, in Tabelle 1b die Milchsäurenachbildung gegenüber dem direkten Versuch und in Tabelle 1c die Werte der nachgebildeten Milchsäure in % des Kontrollversuches. Die Milchsäurewerte zu Versuchsbeginn (direkter Versuch) sind im zerschnittenen Skelettmuskel im Gegensatz zu allen übrigen Organen sehr hoch, weil gerade der Skelettmuskel große Glykogendepots enthält, die bereits durch den Reiz des Zerschneidens zum großen Teil zu Milchsäure abgebaut werden. Alle übrigen Milchsäurewerte wurden nach dreistündiger Digestion des Gewebes in evacuierten Gefäßen erhalten. Als Suspensionslösung diente Phosphatpufferlösung mit einem Phosphatgehalt von m/30 und einem Wasserstoffexponenten $P_H = 7,0$. Der Nullversuch erhielt keine weiteren Zusätze, die Zusatzversuche eine 0,2%ige Glykogen- bzw. eine 0,4%ige Hexosediphosphatlösung und Bromidkonzentrationen in den in den Tabellen angegebenen Verdünnungen.

²⁾ W. Haarmann: Biochem. Zeitschr. 255, 103, 1932.

Tabelle 1a. Skelettmuskel.

Versuch 1, 3 und 4: Kaninchen Versuch 2: Hund.

Milchsäure: mg %.

Nr.	Zusatz	direkt	Null- vers.	Kontroll- versuch	Bromidkonzentration				
					1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
1	—	519	828	828	960	909	861	726	672
	Glykogen	"	"	1785	2142	1866	1509	1622	1758
	Hexosediphosphat	"	"	1401	1623	1077	1320	1650	1518
2	—	444	732	732	756	873	738	615	600
	Glykogen	"	"	735	825	960	765	702	708
	Hexosediphosphat	"	"	1125	1038	1188	1056	1125	825
					1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
3	—	546	672	672	672	714	612	576	563
	Glykogen	"	"	1026	1185	1159	1083	966	882
	Hexosediphosphat	"	"	1266	1260	1332	1266	1245	1053
4	Glykogen	543	669	1392	1344	1260	1238	1212	895
	Hexosediphosphat	"	"	1087	1083	1068	1167	1158	867

Aus den Versuchen geht hervor, daß Bromide in stärkeren Verdünnungen die Milchsäurebildung im Gewebe stark anregen. Das Maximum der Wirkung liegt in den verschiedenen Versuchen nicht bei derselben Bromidkonzentration, sondern schwankt zwischen den Verdünnungen von 10^{-6} bis 10^{-9} . Die maximalen Steigerungen der Milchsäurebildung gegenüber dem Kontrollversuch betragen über 40 %. Mit ansteigender Konzentration läßt die Wirkung nach und schlägt in eine sehr starke Hemmung um, die bei der höchsten von uns angewendeten Konzentration bis zu 85 % beträgt. Die hemmende Konzentration beginnt in Versuch 1 und 2 bei $1 \cdot 10^{-4}$, in Versuch 3 bereits schon bei $1 \cdot 10^{-7}$. Aus diesen Versuchen geht hervor, daß die Konzentrationsabhängigkeiten bei Verwendung von Skelettmuskulatur von verschiedenen Tieren verschieden groß ist.

Tabelle 1 b. Skelettmuskel.
mg % Milchsäurenachbildung.

Nr.	Zusatz	Kontroll- versuch	Bromidkonzentration				
			1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
1	—	309	441	390	342	207	153
	Glykogen	1266	1623	1347	990	1103	1239
	Hexosediphosphat	882	1104	558	801	1131	999
2	—	288	312	429	294	179	156
	Glykogen	291	381	516	321	258	264
	Hexosediphosphat	681	594	744	612	681	381
			1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
3	—	126	126	168	66	30	17
	Glykogen	480	639	613	537	420	336
	Hexosediphosphat	720	714	786	720	699	507
4	Glykogen	849	801	717	695	669	352
	Hexosediphosphat	544	540	525	624	615	324

Die Milchsäurebildung aus Glykogen verhält sich den Bromiden gegenüber anders wie die Milchsäurebildung aus den im Gewebe präformierten Kohlenhydraten. Bei starken Verdünnungen ist hier auch die Milchsäurebildung beschleunigt und in höheren Konzentrationen, wenn auch wesentlich schwächer, gehemmt. Die maximal fördernden Konzentrationen stimmen nicht mit denen überein, die in Versuchen ohne Zusatz zur Beobachtung kommen. Versuch 2, der mit Hundemuskulatur angestellt wurde, hat bei Glykogenzusatz zu keiner vermehrten Milchsäurebildung geführt. Unter der Bromidwirkung sind jedoch erheblich größere Milchsäuremengen entstanden als in den Versuchen ohne Glykogenzusatz. In Versuch 1 liegt das Maximum der Hemmung im Gegensatz zu den übrigen Versuchen nicht bei den höchsten Bromidkonzentrationen, sondern bei der Verdünnung 1.10⁻⁵. In Versuch 4 bleibt jede Steigerung der Milchsäurebildung aus. Die Hemmung setzt bereits bei der Konzentration von 1.10⁻¹¹ ein und wird mit ansteigender Konzentration immer größer.

Tabelle 1c. Skelettmuskel.
Milchsäurenachbildung: % vom Kontrollversuch.

Nr.	Zusatz	Bromidkonzentration				
		1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
1	—	143	126	111	67	50
	Glykogen	128	106	78	87	98
	Hexosediphosphat	125	63	91	128	113
2	—	108	149	102	59	54
	Glykogen	131	177	110	89	91
	Hexosediphosphat	87	109	90	100	56
		1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
3	—	100	144	57	26	15
	Glykogen	133	128	110	88	70
	Hexosediphosphat	99	109	100	97	70
4	Glykogen	94	84	82	79	41
	Hexosediphosphat	99	97	115	113	60

Durch Zusatz von Hexosediphosphat hat sich das ursprüngliche Wirkungsbild noch wesentlich stärker verschoben als ohne Zusatz von Kohlenhydraten. Die Milchsäurebildung ist je nach der zur Wirkung kommenden Bromidkonzentration beschleunigt oder verlangsamt. Die stärkste Hemmung tritt in Versuch 2—4 in der höchsten Giftkonzentration auf, in Versuch 1 bei der Verdünnung 1.10⁻⁶. Im letzteren Versuch haben höhere und niedrigere Konzentrationen (1.10⁻⁷ und 1.10⁻⁴) die Milchsäurebildung um annähernd den gleichen Betrag gesteigert. Große und kleine Giftmengen haben die gleiche Endwirkung ausgeübt.

Versuchsserie II.

In den Tabellen 2a—c sind die Ergebnisse der Glukoseabbauversuche durch Herzmuskelgewebe zusammengestellt.

In der höchsten, von uns verwendeten Konzentration von 1.10⁻³ wird die Milchsäurebildung aus Glukose stark gehemmt, in stärkeren Verdünnungen, jedoch mit Ausnahme von Versuch 2, sehr stark beschleunigt. Das Maximum der Wirkung tritt

bei der Konzentration von $1 \cdot 10^{-9}$ auf mit einer Anregung der Glukosespaltung um 85 % bzw. 66 %. In Versuch 2 ist in allen Konzentrationen die Milchsäurebildung vermindert. Worauf diese starken Unterschiede der Giftempfindlichkeit derselben Abbauvorgänge zurückzuführen sind, läßt sich nicht entscheiden. Wahrscheinlich dürften hormonale Einwirkungen daran beteiligt sein, die die Giftwirkung von Arzneistoffen abändern. Diese Frage zu klären wäre es notwendig, den Einfluß von Hormonen auf die Bromwirkung zu prüfen. Man müßte da in erster Linie an das Thyroxin denken, das nach Untersuchungen von Fromm³⁾ stark in den anaeroben Abbau der Kohlenhydrate eingreift und sie je nach der Konzentration beschleunigt oder verlangsamt.

Tabelle 2a. Herz, Hund.

Milchsäure: mg %.

Nr.	Zusatz	direkt	Nullvers.	Glukose	Bromidkonzentration				
					$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$
1	—	156	324	—	324	348	270	210	162
	Glukose	156	324	504	660	810	714	636	324
2	"	216	382	910	840	855	825	785	478
3	"	368	504	1052	1412	1500	1464	1430	826

Tabelle 2b. Herz, Hund.

mg %: Milchsäurenachbildung.

Nr.	Zusatz	Kontrollversuch	Bromidkonzentration				
			$1 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-3}$
1	—	168	168	192	114	54	6
	Glukose	348	504	654	558	480	168
2	"	694	624	639	609	569	262
3	"	684	1044	1132	1096	1062	458

³⁾ H. Fromm: Inaugural-Dissertation, Münster, (in Vorbereitung).

Tabelle 2c. Herz, Hund.
Milchsäurenachbildung: % vom Kontrollversuch.

Nr.	Zusatz	Bromidkonzentration				
		1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
1	—	100	114	68	32	4
	Glukose	145	185	160	138	48
2	"	90	92	88	82	38
3	"	153	166	160	155	68

Versuchsserie III.

Die Spaltung der Glukose zur Milchsäure durch Hirngewebe muß deshalb getrennt behandelt werden, weil die von der Glukose zur Milchsäure führenden Zwischenstufen in Herz und Hirn verschieden sind. Im Herzen treten intermediäre Hexosephosphorsäuren auf, nicht aber im Hirn. Im ersteren Falle gehören Phosphatstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel zusammen, nicht aber im letzteren Falle.

Aus den Tabellen 3a—c ist der Einfluß von Bromid auf die Milchsäurebildung aus Glukose durch Hirngewebe zu ersehen.

Tabelle 3a. Hirn, Hund.
Milchsäure: mg %.

Nr.	direkt	Null- vers.	Glu- kose	Bromidkonzentration				
				1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
1	90	135	812	836	860	945	805	575
				1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³	—
2	189	225	1628	1371	1260	1058	998	—

Tabelle 3b. Hirn, Hund.
mg %: Milchsäurenachbildung.

Nr.	Kontrollversuch	Bromidkonzentration				
		1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
1	722	746	770	855	715	485
		—	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
2	1439	—	1182	1071	869	809

Tabelle 3c. Hirn, Hund.
Milchsäurenachbildung: % vom Kontrollversuch.

Nr.	Kontrollversuch	Bromidkonzentration				
		1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³
1	100	104	107	118	99	67
		—	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
2	100	—	82	75	60	56

Es zeigte sich, daß die beiden Glukoseabbaumechanismen gleiche Giftempfindlichkeit aufweisen. In den hohen Konzentrationen wird die Milchsäurebildung verzögert, in starken Verdünnungen angeregt. Im Gegensatz zum Herzmuskel sind die Ausschläge wesentlich kleiner. Die maximalen Steigerungen machen nur 18 % gegenüber 85 % beim Herzen aus.

Versuchsserie IV.

In den bisher besprochenen Versuchen wurde das Milchsäurebildungsvermögen der Organe untersucht. Im folgenden wird die Fähigkeit der Organe geprüft, die Milchsäure auch

ohne Sauerstoffgegenwart zum Verschwinden zu bringen. Um einen anaeroben Milchsäureschwund nachweisen zu können, müssen die Versuchsbedingungen günstig gewählt werden. Die Vorbedingung ist, daß die Milchsäurenachbildung im Gewebe unterdrückt wird, weil sich sonst die Milchsäurenachbildung und Milchsäureschwund überlagern. Ist die Milchsäurenachbildung größer als der Milchsäureschwund, so kann der Milchsäureschwund nicht sichtbar werden. Milchsäurenachbildung wird, wie Haarmann⁴⁾ zeigte, durch Zusatz von monobromessigsaurem Natrium verhindert. Für derartige Versuche sind besonders Leber und Hirngewebe sehr geeignet, da in diesen Organen an sich schon die Milchsäurenachbildung sehr gering ist. Laktatzusatz läßt den anaeroben Milchsäureschwund stärker hervortreten. In unseren Versuchen wurde deshalb Natriumlaktat hinzugefügt.

Tabelle 4a. Monobromacetat.

Leber und Hirn: Laktatzusatz.

Milchsäure: mg %.

Nr.	direkt	Nullvers.	Kontr. vers.	Bromidkonzentration					Organ	Versuchstier
				1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³		
1	931	876	329	675	752	576	526	310	Hirn	Hund
2	2076	—	1778	1140	1218	1280	1320	734	"	"
3	1077	—	840	635	655	655	783	514	Leber	"
4	954	—	738	747	768	717	573	609	"	"
5	584	734	514	532	540	564	548	536	Musk	Kaninch.
				1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³		
6	927	—	546	705	741	609	595	498	Leber	Kaninch.
7	519	828	552	—	546	537	549	501	Musk	"

Die Versuchsergebnisse sind in den Tabellen 4a—c zusammengestellt. Aus den Versuchen geht hervor, daß Bromid auf den anaeroben Milchsäureschwund im Skelettmuskel ohne Einwir-

⁴⁾ W. Haarmann: Biochem. Zeitschr. 256, 326, 1932.

kung ist, ihn dagegen in Hirn- und Lebergewebe stark beeinflusst. Bestimmte Gesetzmäßigkeiten lassen sich nicht aufstellen. In Versuch 1 ist der anaerobe Milchsäureschwund verschlechtert, in Versuch 2 dagegen verbessert. Für die Leberversuche gilt das gleiche.

Tabelle 4b. Monobromacetat.

Milchsäureschwund: mg %.

Nr.	Kontrollversuch	Bromidkonzentration					Organ	Versuchstier
		1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³		
1	602	256	179	355	405	621	Hirn	Hund
2	298	936	858	804	756	1342	"	"
3	237	442	422	422	294	563	Leber	"
4	216	207	188	237	381	345	"	"
5	70	52	44	20	36	48	Muskel	Kaninchen
		1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³		
6	381	222	186	318	332	429	Leber	Kaninchen
7	33	—	27	18	30	18	Muskel	"

Tabelle 4c. Monobromacetat.

Milchsäureschwund: % vom Kontrollversuch.

Nr.	Bromidkonzentration					Organ	Versuchstier
	1.10 ⁻¹¹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻³		
1	43	30	59	68	103	Hirn	Hund
2	314	288	270	254	450	„	„
3	187	178	178	124	238	Leber	„
4	96	87	109	176	159	„	„
	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³		
6	58	49	83	87	113	Leber	Kaninchen

Zusammenfassung.

Bromide greifen sehr stark in die intermediären Kohlenhydratabbauvorgänge ein. Sie beschleunigen die Milchsäurebildung aus Glukose in verdünnter Lösung besonders stark im Herzmuskelgewebe, weniger stark im Hirngewebe; in höheren Konzentrationen ist die Milchsäurebildung stark verzögert. Das Milchsäurebildungsvermögen des Skelettmuskels wird durch hohe Konzentrationen sehr stark herabgesetzt, durch starke Verdünnungen dagegen angeregt. Das gleiche gilt für den Abbau des Glykogens und der Hexosediphosphorsäure. Die Konzentrationsempfindlichkeit von verschiedenen Abbauvorgängen im selben Gewebe wechselt sehr stark, derart, daß die gleiche Bromidkonzentration die Milchsäurebildung aus dem einen Kohlenhydrat anregen, aus einem anderen bereits hemmen kann. Der Einfluß von Bromid auf den anaeroben Milchsäureschwund ist unsicher. Je nach dem Versuchstier kommen Förderungen und Verschlechterungen zur Beobachtung.

Lebenslauf.

Am 4. 4. 1906 wurde ich als Sohn des Studienrats Joh. Marke in Rüthen geboren. Nach vierjährigem Besuch der Volksschule in Arnsberg, wurde ich daselbst in die Sexta des Gymnasiums aufgenommen. 1925 bestand ich das Lehrerexamen und erhielt 1928 auf dem Mauritianum in Büren mein Reifezeugnis. Ich studierte Medizin in Innsbruck, Wien, Berlin und in Münster. 1933 meldete ich mich zum Staatsexamen in Münster.

